

Vyvanse (LDX) Is The #1 Prescribed Branded ADHD Medication In The U.S.A¹

התרופה הראשונה בעלת טכנולוגית הפרו דראג
לאיזון תסמיני ADHD²

טכנולוגיה יחודית - כמוסת ויאנס מכילה מולקולה במצב לא פעיל (פרו-דראג) שהופכת לפעילה באמצעות תהליך אנזימטי בכדוריות הדם האדומות. כתוצאה מכך החומר הפעיל משתחרר בגוף באופן הדרגתי לאורך זמן.



משך פעולה של **13-14 שעות**^{3,4}, לכיסוי הפעילויות גם אחר הצהריים בתחומים שונים: אקדמי, חברתי, התנהגותי, שיפור בדימוי העצמי ובקשרים התוך משפחתיים.



סיכון מופחת לאפקט ריבאונד⁵ ותונדותיות מופחתת לאורך היום ברמות החומר הפעיל בדם.



נוחות שימוש - ניתן לבלוע את הכמוסה בשלמותה או להמיס את תוכן הכמוסה במים, מיץ תפוזים או יוגורט⁶. אפשרויות אלו מהוות יתרון משמעותי עבור מטופלים המתקשים בבליעת תרופות.






תרופת מקור שיעילותה הוכחה במחקרים קליניים מקיפים⁷⁻¹¹.



מינון משוער של d-amphetamine (לאחר הידרולוזת הפרודרג בכדוריות הדם האדומות)¹²

שלושה מינונים⁶



d-AMP מ"ג 8.9	← - - - - -	LDX מ"ג 30		מינון התחלתי מומלץ
d-AMP מ"ג 14.8	← - - - - -	LDX מ"ג 50		
d-AMP מ"ג 20.8	← - - - - -	LDX מ"ג 70		מינון מירבי ⁶



References: 1. Takeda Data on file, 2021 | 2. Sharman J, Pennick M. Neuropsychiatr Dis Treat 2014;10:2275-80 | 3. Wigal SB, et al. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 2009;3:17. | 4. Wigal T, et al. Behav Brain Func 2010;6:34 | 5. CADDRA - Canadian ADHD Resource Alliance: Canadian ADHD Practice Guidelines, 4.1 Edition, Toronto ON; CADDRA, 2020. | 6. Vyvanse prescribing information approved by Israeli MOH | 7. Findling RL, et al. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2009;19(6):649-662. | 8. Findling RL, et al. J Child Adolesc Psychopharm. 2013;23(1):11-21. | 9. Dittmann RW, et al. CNS Drugs. 2013;27:1081-1092. | 10. Coghill D, et al. Eur Neuropsychopharmacol. 2013;23(10):1208-1218. | 11. Newcorn JH, et al. CNS Drugs. 2017;31(11):999-1014 | 12. Elvalse SmPc

For further information please refer to Vyvanse full prescribing information as approved by the Israeli MoH